



AZOXYSTROBIN + CIPROCONAZOL
FUNGICIDA / GRÁNULOS DISPERSABLES EN AGUA

Ayuda al control de enfermedades con un excelente efecto para cultivos recomendados.

ROBINZOL® contiene azoxystrobin y ciproconazol. **Grupo químico:** Azoxystrobin (estrobilurina); Ciproconazol (triazol).

COMPOSICIÓN PORCENTUAL:

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Azoxystrobin: metil (E)-2-{2-[6-(2-cianofenoxi)pirimidin-4-ilo]fenil}-3-metoxiacrilato (Equivalente a 600 g de i.a./kg)	60.0
Ciproconazol: (2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-clorofenil)-3-ciclopropil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-ol (Equivalente a 240 g de i.a./kg)	24.0
INGREDIENTES INERTES:	
Humectante, dispersante y portador.	16.0
TOTAL	100.0

REG.: RSCO-MEZC-HEDE-1301G-X0025-420-084



INSTRUCCIONES DE USO

ROBINZOL® es un fungicida que se recomienda para aplicación en los cultivos y para las plagas aquí indicadas.

APLICACIÓN FOLIAR:

CULTIVO	INTERVALO DE SEGURIDAD	PLAGAS	DOSIS g/ha	OBSERVACIONES
Trigo	Sin Limite	Roya anaranjada (<i>Puccinia recondita</i>) Mancha de la hoja (<i>Septoria tritici</i>)	300 - 400	Realizar dos aplicaciones al follaje, a intervalo de 14 días; agregar a la mezcla un coadyuvante a razón de 100mL/100L de agua; volumen de aplicación 550 - 650 L de agua/ha.

Intervalo de seguridad: (SL) Sin límite.

Tiempo de reentrada a lugares tratados: 24 horas.

MÉTODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Con el equipo de protección personal puesto, el cual consta de gorra y overol de algodón, anteojos de seguridad con protección hermética, mascarilla contra polvo y vapores tóxicos, así como guantes y botas de neopreno, abra el producto de la siguiente manera; rompa con tijeras la esquina superior de la bolsa, procurando no entrar en contacto con el producto. En el equipo de aplicación llenar el tanque hasta $\frac{3}{4}$ de su capacidad, posteriormente agregue **ROBINZOL®** aspersión, con suficiente cantidad de agua para lograr un buen cubrimiento del follaje. Mantener en constante agitación. Aplíquelo inmediatamente después de preparar la mezcla.

CONTRAINDICACIONES

Evite aplicar **ROBINZOL®** durante los períodos de alta temperatura (mayor a 28 °C) y alta radiación, o cuando exista alta probabilidad de lluvia. No aplicar con vientos superiores a 10 km/h o cuando exista la presencia de rocío sobre el follaje.

FITOTOXICIDAD

ROBINZOL® no es fitotóxico a las dosis y en los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo con lo recomendado en esta etiqueta.

INCOMPATIBILIDAD

ROBINZOL® es compatible con AZOXYSTROBIN 49% + TEBUCONAZOLE 36% WG y con TEBUCONAZOLE 75% WG, que cuente con registro sanitario en México. Aplicar en mezcla únicamente con productos que cuenten con cultivos autorizados.

MANEJO DE LA RESISTENCIA

PARA PREVENIR EL DESARROLLO DE POBLACIONES RESISTENTES, SIEMPRE RESPETE LAS DOSIS Y LAS FRECUENCIAS DE APLICACIÓN; EVITE EL USO REPETIDO DE ESTE PRODUCTO, ALTERNÁNDOLO CON OTROS GRUPOS QUÍMICOS DE DIFERENTES MODOS DE ACCIÓN Y DIFERENTES MECANISMOS DE DESTOXIFICACIÓN Y MEDIANTE EL APOYO DE OTROS MÉTODOS DE CONTROL.

en las dosis recomendadas y termine de llenar con agua. Aplíquese con equipo terrestre, por

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Use el equipo de protección adecuado: mascarilla contra polvos o vapores, lentes industriales, guantes, overol y botas de hule. Evite inhalar la aspersión durante la aplicación o preparación de la mezcla. No permita que el rocío caiga sobre la piel durante la aplicación. Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con detergente o una solución alcalina. Si observa algún malestar durante el trabajo, deténgase

y llame al médico inmediatamente. Consérvese en su envase original cerrado, mientras no se utilice. Almacénese en un lugar seguro, bajo llave, protegido de la intemperie, lejos de la luz y el fuego directo.

PRIMEROS AUXILIOS

Si hay contacto con los ojos: En caso de contacto, mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y gentilmente con agua por 15-20 minutos. Quite los lentes de contacto, si es que los tiene, después de los primeros 5 minutos y continúe enjuagando los ojos. Llame al centro de control de envenenamiento o a un médico para el tratamiento.

Si hay contacto con la piel: Retire la ropa contaminada. Enjuague la piel inmediatamente con suficiente agua por 15-20 minutos. Llame al centro de control de envenenamientos o a un médico para el tratamiento.

Si se ingiere: Llame al centro de control de envenenamiento o al doctor inmediatamente para el tratamiento. Haga que la persona sorba un vaso de agua si está en posibilidad de deglutir. No induzca el vómito a menos que lo haya indicado el centro de control de envenenamientos o un doctor. No dé nada por la boca a una persona inconsciente.

Si se inhala: Retire a la persona a un lugar fresco y bien ventilado. Si la persona no respira, proporcione respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, proporcione oxígeno. Llame al centro de control de envenenamientos o a un médico para el tratamiento. Tenga el contenedor o etiqueta con usted cuando llame al centro de control de envenenamiento o al doctor para el tratamiento.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO

ROBINZOL® contiene azoxiestrobina y ciproconazol. Grupo químico: Azoxiestrobina (estrobilurina); Ciproconazol (triazol). Signos y síntomas de intoxicación: VÍA ORAL: Su ingestión provoca dolor de cabeza, depresión nerviosa y desorientación. VÍA DERMAL: Puede ocasionar ligera irritación en los ojos como conjuntivitis; en la piel puede causar dermatitis. VÍA INHALATORIA: Puede provocar irritación en el tracto respiratorio. Tratamiento y antídoto: El tratamiento debe ser sintomático, no tiene antídoto específico. El tratamiento de la exposición debe ser directamente al control de síntomas y condición clínica

EN CASO DE EMERGENCIA COMUNÍQUESE A LOS TELÉFONOS DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA SIN TOX LAS 24 HRS 01 (55) 5598-6659, 5611-2634 Y LADA SIN COSTO 01 800-009-2800. O AL CENTRO DE TRATAMIENTO EN INTOXICACIONES POR AGROQUÍMICOS, ATOX: 01 800 000 ATOX (2869).

Distribuidor:

AMVAC MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.



An American Vanguard Company

Alcamo 3070, Col. Prados de Providencia
Guadalajara, Jalisco, México, C.P. 44670

Tel: 01 (33) 3110 1976

01 800 00 AMVAC (26822)

www.amvac.c.om.mx

