

TordonXT™

HERBICIDA AGRÍCOLA
CONCENTRADO SOLUBLE - SL

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

INGREDIENTES

INGREDIENTES	ACTIVOS:
Aminopyralid 4-amino-3,6-dichloro-2-pyridinecarboxylic acid. Equivalente a 24,37 g/L de sal dometilamina de aminopirialid.	20 g/L
2,4-D 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. Equivalente a 289.2 g/L de sal dimetilamina 2,4 -D.	240 g/L
INGREDIENTES ADITIVOS	c.s.p 1 L

Registro Nacional ICA No. 1793

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

TordonXT™

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”.

TordonXT™ es un herbicida sistémico selectivo a los pastos, efectivo para el control de malezas de hoja ancha tipo herbáceas, semileñosas y leñosas en potreros.

La eficacia de **TordonXT™** en el control de malezas de hoja ancha incrementa la carga de pasto por potreros (ton/ha), lo cual repercute en mayor ganancia de peso y/o producción de leche y mayor rentabilidad para el ganadero.

CULTIVO	MALEZA	DOSIS	P.C.	P.R.
POTREROS	Algodoncillo <i>Peltaea speciosa</i>	1.5 L / 200 L (0.75% v/v) 3.0 L/ha*		
	Arruinaticos <i>Melochia parviflora</i>	1.5 - 2.0 L / 200 L (0.75 - 1.0 % v/v) 3.0 - 4.0 L/ha	7 días	0 horas
	Dormidera <i>Mimosa pudica</i>	1.0 - 1.5 L / 200 L (0.5 - 0.75% v/v) 2.0 - 3.0 L/ha*		
	Bicho o Chilinchil <i>Senna obtusifolia</i>	1.0 L / 200 L (0.5% v/v) 2.0 L/ha*		
	Bejuco lanoso <i>Centrosema pubescens</i>	1.0 L / 200 L (0.5% v/v) 2.0 L/ha*		
	Malva <i>Malachra alceifolia</i>	2.0 L / 200 L (1.0% v/v) 4.0 L/ha*		
	Escoba blanca <i>Sida rhombifolia</i>	**1.5 - 2.0 L / 200 L (0.75 - 1.0 % v/v) 3.0 - 4.0 L/ha* ***0.75 - 1.0 L / 200L (0.375 - 0.5% v/v) 1.5 - 2 L/ha*		

* En un volumen de agua de 400 L/ha.

** Para áreas densamente pobladas de malezas.

***Para áreas con malezas diseminadas en manchones.

P.C. Período de Carencia: Intervalo de seguridad entre la última aplicación del plaguicida y la cosecha del producto agrícola.

P.R. Período de Reentrada: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación del plaguicida y el ingreso de personas al área tratada.

RECOMENDACIONES DE PASTOREO

Se recomienda la labor de pastoreo y alimentación con heno en zonas no tratadas por 3 días, de lo contrario existe el riesgo de residuos del ingrediente activo en la orina y/o estiércol el cual puede causar daños a plantas sensibles de hoja ancha.



TordonXT™

FRECUENCIA Y ÉPOCAS DE APLICACIÓN

Utilice la dosis baja cuando las malezas sean de semilla y la dosis alta cuando vengan de rebrote. Aplicar cuando las malezas tengan una altura entre 30 - 80 cm.

Aplicar teniendo en cuenta la infestación de malezas en el potrero.

MÉTODO DE APLICACIÓN:

En aplicación terrestre en potreros, **TordonXT™** se debe aplicar mediante aspersión directa a las malezas, utilizando aspersor manual de mochila, o si hay posibilidad, usando equipo de aspersión acoplado al tractor. Para la aplicación por aspersor manual, hay que preparar la mezcla, llenando el tanque de aplicación con agua hasta $\frac{1}{4}$ de su volumen y comenzando a agitar; luego agregar la dosis recomendada del producto y completar el nivel de agua. El volumen de agua recomendado es de mínimo 400 litros por hectárea para aplicaciones totales.

Tenga en cuenta estas recomendaciones:

- No aplique **TordonXT™** en potreros que se vayan a rotar inmediatamente con cultivos de hoja ancha tales como soya, algodón u otros.
- No utilice estiércol de ganado alimentado en potreros tratados con **TordonXT™**, como fertilizante o enmienda.
- No aplique en áreas cercanas a cultivos susceptibles (hoja ancha).
- No aplique **TordonXT™** vía aérea.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD

Evite el contacto con agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes. No es fitotóxico para los cultivos, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



TordonXT™

LEA ESTA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE
DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
DE USO Y APLICACIÓN

- CAUSA DAÑO TEMPORAL A LOS OJOS.
- EL CONTACTO PROLONGADO O REPETIDO PUEDE CAUSAR ALERGIAS EN CIERTAS PERSONAS.

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”.

Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

“Este producto puede ser mortal si se ingiere”.

“Utilice ropa protectora durante la manipulación y la aplicación”.

Evite que la mezcla caiga o sea acarreada por el viento sobre cultivos susceptibles.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con la piel: Retire la ropa contaminada. Lávese inmediatamente la parte afectada con abundante agua durante 15-20 minutos. Consulte a un médico.

En caso de contacto con los ojos: Mantenga los ojos abiertos y lávelos suave y lentamente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si tiene lentes de contacto, remuévalos después de los primeros 5 minutos, luego continúe lavando los ojos. Consulte a un médico.

En caso de ingestión: Inmediatamente llame a un médico o comuníquese con los teléfonos de emergencia para recibir asistencia. Suministre al paciente un vaso con agua si puede beberlo. No induzca el vómito a menos que sea indicado por un médico o por el Centro de Atención Toxicológica. Nunca administre nada por la boca a una persona inconsciente.

En caso de inhalación: Lleve a la persona al aire libre. Consulte a un médico si es necesario.

ANTÍDOTO: No existe antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS Y QUÍMICAS 24 HORAS

01 8000 916012 Fuera de Bogotá.

En Bogotá comunicarse con el (091) 2886012

ALMACENAMIENTO

No almacenar en casas de habitación.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

No debe transportarse con productos de consumo humano o animal.

Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.

No reenvasar o depositar el contenido en otros envases. Manténgalo alejado del calor y las chispas.

Almacenar en un lugar seco.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

No contamine lagos, ríos, estanques, canales o fuentes de agua con el producto, el lavado de los equipos, o al botar los desechos, hágalo en la forma específicamente recomendada. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

No aplicar cuando haya posibilidad de movimiento o escorrentía del producto por el suelo.

No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre de la aspersión desde las áreas tratadas.

Evite contaminar con **TordonXT™** las aguas que vayan a ser utilizadas en consumo humano, animal o riego de cultivo. “Respete las franjas de seguridad mínimas de 10 metros para aplicación terrestre para aplicación aérea distantes de los cuerpos o cursos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, cultivos susceptibles de daño por contaminación, o cualquier otra área que requiera protección”.

ADVERTENCIA: “NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO”.

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO, ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSITÉLO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

Fecha aprobación ICA: 13/07/2019

